Medicamentos para la diabetes

Medicamentos orales (píldoras)

Glucophage®/ Glucophage® XR

Nombre genérico
Metformina HCL

Cómo funciona
Ayuda al hígado a producir menos azúcar (glucosa).

Cómo tomarlo
Debe tomarlo con alimentos para reducir la hinchazón y la diarrea.

Posibles efectos secundarios
- Diarrea
- Náuseas
- Sabor metálico en la boca

Importante
- Si consume alcohol, limite a una bebida para mujeres y dos bebidas para hombres.

Precauciones
- Si le realizan un estudio con medio de contraste, consulte a su médico cuándo debe dejar de tomar este medicamento.

Glucotrol®/ Glucotrol XL®

Nombre genérico
Glipizida

Cómo funciona
Ayuda al páncreas a producir más insulina.

Cómo tomarlo
Debe tomarlo entre 15 y 30 minutos antes de una comida.

Posibles efectos secundarios
- Nivel bajo de azúcar en la sangre
- Reacción alérgica a las sulfas

Starlix®

Nombre genérico
Nateglinida

Cómo funciona
Ayuda al páncreas a producir más insulina.

Cómo tomarlo
Debe tomarlo con cada comida.

Posibles efectos secundarios
- Nivel bajo de azúcar en la sangre

DiaBeta®

Nombre genérico
Gliburida

Cómo funciona
Ayuda al páncreas a producir más insulina.

Cómo tomarlo
Debe tomarlo antes de las comidas, según las indicaciones de su médico.

Posibles efectos secundarios
- Nivel bajo de azúcar en la sangre
- Reacción alérgica a las sulfas

Amaryl®

Nombre genérico
Glimepirida

Cómo funciona
Ayuda al páncreas a producir más insulina.

Cómo tomarlo
Debe tomarlo antes de las comidas, según las indicaciones de su médico.

Posibles efectos secundarios
- Nivel bajo de azúcar en la sangre
- Reacción alérgica a las sulfas

Actos®

Nombre genérico
Pioglitazona HCL

Cómo funciona
Ayuda al cuerpo a usar mejor la insulina.

Cómo tomarlo
Debe tomarlo con o sin alimentos.

Posibles efectos secundarios

- Hinchazón en las manos o los pies.
- Aumento de peso.
- Puede empeorar los síntomas de insuficiencia cardíaca.

Tradjenta®/Nesina®*/Januvia®*

Nombre genérico
Linagliptina/alogliptina/sitagliptina

Cómo funciona
Ayuda al cuerpo a liberar insulina después de las comidas y reduce la cantidad de azúcar que produce el hígado.

Cómo tomarlo
Debe tomarlo con o sin alimentos.

Posibles efectos secundarios

- Síntomas similares a los del resfriado
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor en las articulaciones

Jardiance®*/Invokana®*/Farxiga®*

Nombre genérico
Empagliflozina/canagliflozina/dapagliflozina

Cómo funciona
Ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de azúcar por medio de la orina (pis).

Cómo tomarlo
Debe tomarlo una vez al día con el desayuno.

Posibles efectos secundarios

- Deshidratación
- Mareos
- Infecciones por hongos
- Infecciones del tracto urinario

Píldoras combinadas

Nombre del medicamento	Qué contiene
Glipizida-metformina	Glipizida y metformina HCL
Jentadueto®	Linagliptina (Tradjenta®) y metformina HCL
Jentadueto® XR	Linagliptina (Tradjenta®) y metformina ER
Glucovance®	Gliburida y metformina HCL
Janumet®*	Sitagliptina (Januvia®) y metformina HCL
Janumet® XR*	Sitagliptina (Januvia®) y metformina ER
Invokamet®*	Canagliflozina (Invokana®) y metformina HCL
Invokamet® XR*	Canagliflozina (Invokana®) y metformina ER
Synjardy®*	Empagliflozina (Jardiance®) y metformina HCL
Xigduo®*	Dapagliflozina (Farxiga®) y metformina HCL
Glyxambi®*	Empagliflozina (Jardiance®) y linagliptina (Tradjenta®)

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).