

Medicamentos inyectables para la diabetes

Insulina de acción rápida

Novolog®

Genérico

Insulina aspart

Cuándo aplicarla

Aplíquela entre 10 y 15 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción

De 30 a 90 minutos

Duración de acción

De 3 a 5 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Humalog®

Genérico

Insulina lispro

Cuándo aplicarla

Aplíquela entre 10 y 15 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción

De 30 a 90 minutos

Duración de acción

De 3 a 5 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Apidra®

Genérico

Insulina glulisina

Cuándo aplicarla

Aplíquela entre 10 y 15 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción

De 30 a 90 minutos

Duración de acción

De 3 a 5 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Novolin® R

Genérico

Insulina humana regular

Cuándo aplicarla

Aplíquela 30 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 30 y 60 minutos

Pico de acción

De 2 a 4 horas

Duración de acción

De 5 a 8 horas

Caducidad después de abrirla

42 días

Humulin® R*

Genérico

Insulina humana regular

Cuándo aplicarla

Aplíquela 30 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción

De 30 a 60 minutos

Pico de acción

De 2 a 4 horas

Duración de acción

De 5 a 8 horas

Caducidad después de abrirla

31 días



CENTRAL HEALTH

Insulina de acción intermedia

Novolin® N

Genérico

Insulina NPH

Cuándo aplicarla

Aplíquela según las indicaciones de su médico.

Tiempo de inicio de acción

Entre 1 y 3 horas

Pico de acción

De 4 a 8 horas

Duración de acción

De 14 a 24 horas

Caducidad después de abrirla

42 días

Humulin® N*

Genérico

Insulina NPH

Cuándo aplicarla

Aplíquela según las indicaciones de su médico.

Tiempo de inicio de acción

Entre 1 y 3 horas

Pico de acción

De 4 a 8 horas

Duración de acción

De 14 a 24 horas

Caducidad después de abrirla

31 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).



Insulina de acción prolongada:

Semglee®

Genérico

Insulina glargina

Cuándo aplicarla

Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción

90 minutos

Pico de acción

No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción

Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Lantus®*

Genérico

Insulina glargina

Cuándo aplicarla

Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción

90 minutos

Pico de acción

No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción

Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Humulin® R U-500*

Genérico

Insulina humana regular

Cuándo aplicarla

Aplíquela 30 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción 30 minutos

Pico de acción

De 4 a 8 horas

Duración de acción

Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Tresiba®*

Genérico

Insulina degludec

Cuándo aplicarla

Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción

1 hora

Pico de acción

No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción

De 36 a 42 horas

Caducidad después de abrirla

56 días

Toujeo®*

Genérico

Insulina glargina

Cuándo aplicarla

Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción

6 horas

Pico de acción

No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción

De 24 a 36 horas

Caducidad después de abrirla

42 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).



Mezclas de insulina

NovoLog® 70/30

Genérico

Insulina aspart

Cuándo aplicarla

Aplíquela 15 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción

De 2 a 4 horas

Duración de acción

Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

Humulin® 70/30*

Genérico

Insulina NPH

Cuándo aplicarla

Aplíquela 30 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 30 y 60 minutos

Pico de acción

De 1 a 5 horas

Duración de acción

De 18 a 24 horas

Caducidad después de abrirla

31 días

Novolin® 70/30

Genérico

Insulina NPH

Cuándo aplicarla

Aplíquela 30 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción

Entre 30 y 60 minutos

Pico de acción

De 1 a 5 horas

Duración de acción

Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla

42 días

Humalog® 75/25*

Genérico

Insulina aspart

Cuándo aplicarla

15 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción

De 10 a 15 minutos

Pico de acción

Varía

Duración de acción

De 16 a 22 horas

Caducidad después de abrirla

28 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).



Inyecciones agonistas del GLP-1

Victoza®

Genérico

Liraglutida

Cómo funciona

- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla

- Una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.
- Una vez a la semana, el mismo día cada semana.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.

Posibles efectos

- | | |
|---------------------|---|
| • Náuseas | • Disminución del apetito |
| • Vómitos | |
| • Diarrea | • Indigestión |
| • Estreñimiento | • Reflujo ácido |
| • Dolor de cabeza | • Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes) |
| • Dolor de estómago | |

Caducidad después de abrirla

30 días

Ozempic®*

Genérico

Semaglutida

Cómo funciona

- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla

- Una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.
- Una vez a la semana, el mismo día cada semana.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.

Posibles efectos

- | | |
|---------------------|---|
| • Náuseas | • Disminución del apetito |
| • Vómitos | |
| • Diarrea | • Indigestión |
| • Estreñimiento | • Reflujo ácido |
| • Dolor de cabeza | • Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes) |
| • Dolor de estómago | |

Caducidad después de abrirla

56 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).



Trulicity®*

Genérico

Dulaglutida

Cómo funciona

- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla

- Una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.
- Una vez a la semana, el mismo día cada semana.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.

Posibles efectos

- | | |
|---------------------|---|
| • Náuseas | • Disminución del apetito |
| • Vómitos | |
| • Diarrea | • Indigestión |
| • Estreñimiento | • Reflujo ácido |
| • Dolor de cabeza | • Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes) |
| • Dolor de estómago | |

Caducidad después de abrirla

14 días

Byetta®*

Genérico

Exenatida

Cómo funciona

- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla

Dos veces al día.

Posibles efectos

- | | |
|---------------------|---|
| • Náuseas | • Disminución del apetito |
| • Vómitos | |
| • Diarrea | • Indigestión |
| • Estreñimiento | • Reflujo ácido |
| • Dolor de cabeza | • Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes) |
| • Dolor de estómago | |

Caducidad después de abrirla

30 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).



Soliqua®*

Genérico

Insulina glargina/lixisenatida

Cómo funciona

- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Contiene insulina de acción prolongada.

Cuándo aplicarla

Una vez al día, por la mañana, antes de consumir su primera comida del día.

Posibles efectos

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Disminución del apetito
- Indigestión
- Reflujo ácido
- Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes)

Caducidad después de abrirla

28 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).

