Thuốc điều trị tiểu đường

Thuốc uống (dạng viên)

Glucophage® / Glucophage® XR

Tên hoạt chất
Metformin HCL

Cơ chế tác dụng
Giúp gan giảm sản xuất đường (glucose).

Cách dùng
Uống cùng thức ăn để giảm đầy bụng và tiêu chảy.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Tiêu chảy
- Buồn nôn
- Có vị kim loại trong miệng

Lưu ý quan trọng
- Nếu uống rượu bia, hãy giới hạn ở một ly đối với nữ và hai ly đối với nam.

Thận trọng
- Nếu quý vị cần làm xét nghiệm có sử dụng thuốc cản quang, hãy hỏi bác sĩ khi nào cần ngừng dùng thuốc này.

Glucotrol® / Glucotrol XL®

Tên hoạt chất
Glipizide

Cơ chế tác dụng
Giúp tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn.

Cách dùng
Uống trước bữa ăn 15–30 phút.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Hạ đường huyết
- Dị ứng với sulfa

Starlix®

Tên hoạt chất
Nateglinide

Cơ chế tác dụng
Giúp tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn.

Cách dùng
Uống cùng mỗi bữa ăn.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Hạ đường huyết

DiaBeta®

Tên hoạt chất
Glyburide

Cơ chế tác dụng
Giúp tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn.

Cách dùng
Uống trước bữa ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Hạ đường huyết
- Dị ứng với sulfa

Amaryl®

Tên hoạt chất
Glimepiride

Cơ chế tác dụng
Giúp tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn.

Cách dùng
Uống trước bữa ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Hạ đường huyết
- Dị ứng với sulfa

Actos®

Tên hoạt chất
Pioglitazone HCL

Cơ chế tác dụng
Giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Cách dùng
Có thể uống cùng hoặc không cùng thức ăn.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Sưng bàn tay hoặc bàn chân
- Tăng cân
- Có thể làm các triệu chứng suy tim trở nên nghiêm trọng hơn

Tradjenta® / Nesina®* / Januvia®*

Tên hoạt chất
Linagliptin / alogliptin / sitagliptin

Cơ chế tác dụng
Giúp cơ thể tiết insulin sau bữa ăn và làm giảm lượng đường do gan sản xuất.

Cách dùng
Có thể uống cùng hoặc không cùng thức ăn.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Các triệu chứng giống cảm lạnh
- Đau đầu
- Đau bụng
- Buồn nôn
- Nôn ói
- Đau khớp

Jardiance®* / Invokana®* / Farxiga®*

Tên hoạt chất
Empagliflozin / canagliflozin / dapagliflozin

Cơ chế tác dụng
Giúp cơ thể đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu

Cách dùng
Uống mỗi ngày một lần cùng với bữa sáng.

Tác dụng phụ có thể gặp
- Mất nước
- Chóng mặt
- Nhiễm trùng nấm men
- Nhiễm trùng đường tiết niệu

Thuốc viên kết hợp

Tên thuốc	Thành phần
Glipizide-Metformin	Glipizide và metformin HCL
Jentadueto®	Linagliptin (Tradjenta®) và metformin HCL
Jentadueto® XR	Linagliptin (Tradjenta®) và metformin ER
Glucovance®	Glyburide và metformin HCL
Janumet®*	Sitagliptin (Januvia®) và metformin HCL
Janumet® XR*	Sitagliptin (Januvia®) và metformin ER
Invokamet®*	Canagliflozin (Invokana®) và metformin HCL
Invokamet® XR*	Canagliflozin (Invokana®) và metformin ER
Synjardy®*	Empagliflozin (Jardiance®) và metformin HCL
Xigduo®*	Dapagliflozin (Farxiga®) và metformin HCL
Glyxambi®*	Empagliflozin (Jardiance®) và linagliptin (Tradjenta®)

* Các thuốc hiện chưa được chi trả, không nằm trong danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả hoặc cần đăng ký Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân (PAP).