Medicamentos inyectables para la diabetes

Insulina de acción rápida

Novolog®

Genérico
Insulina aspart

Cuándo aplicarla
Aplíquela entre 10 y 15 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción
De 30 a 90 minutos

Duración de acción
De 3 a 5 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Humalog®

Genérico
Insulina lispro

Cuándo aplicarla
Aplíquela entre 10 y 15 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción
De 30 a 90 minutos

Duración de acción
De 3 a 5 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Apidra®

Genérico
Insulina glulisina

Cuándo aplicarla
Aplíquela entre 10 y 15 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción
De 30 a 90 minutos

Duración de acción
De 3 a 5 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Novolin® R

Genérico
Insulina humana regular

Cuándo aplicarla
Aplíquela 30 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción
Entre 30 y 60 minutos

Pico de acción
De 2 a 4 horas

Duración de acción
De 5 a 8 horas

Caducidad después de abrirla
42 días

Humulin® R*

Genérico
Insulina humana regular

Cuándo aplicarla
Aplíquela 30 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción
De 30 a 60 minutos

Pico de acción
De 2 a 4 horas

Duración de acción
De 5 a 8 horas

Caducidad después de abrirla
31 días

CENTRAL HEALTH

Insulina de acción intermedia

Novolin® N

Genérico
Insulina NPH

Cuándo aplicarla
Aplíquela según las indicaciones de su médico.

Tiempo de inicio de acción
Entre 1 y 3 horas

Pico de acción
De 4 a 8 horas

Duración de acción
De 14 a 24 horas

Caducidad después de abrirla
42 días

Humulin® N*

Genérico
Insulina NPH

Cuándo aplicarla
Aplíquela según las indicaciones de su médico.

Tiempo de inicio de acción
Entre 1 y 3 horas

Pico de acción
De 4 a 8 horas

Duración de acción
De 14 a 24 horas

Caducidad después de abrirla
31 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).

Insulina de acción prolongada:

Semglee®

Genérico
Insulina glargina

Cuándo aplicarla
Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción
90 minutos

Pico de acción
No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción
Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Lantus®*

Genérico
Insulina glargina

Cuándo aplicarla
Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción
90 minutos

Pico de acción
No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción
Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Humulin® R U-500*

Genérico
Insulina humana regular

Cuándo aplicarla
Aplíquela 30 minutos antes de una comida.

Tiempo de inicio de acción 30 minutos

Pico de acción
De 4 a 8 horas

Duración de acción
Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Tresiba®*

Genérico
Insulina degludec

Cuándo aplicarla
Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción
1 hora

Pico de acción
No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción
De 36 a 42 horas

Caducidad después de abrirla
56 días

Toujeo®*

Genérico
Insulina glargina

Cuándo aplicarla
Aplíquela una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.

Tiempo de inicio de acción
6 horas

Pico de acción
No tiene pico de acción (actúa de manera constante)

Duración de acción
De 24 a 36 horas

Caducidad después de abrirla
42 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).

Mezclas de insulina

NovoLog® 70/30

Genérico
Insulina aspart

Cuándo aplicarla
Aplíquela 15 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción
Entre 10 y 20 minutos

Pico de acción
De 2 a 4 horas

Duración de acción
Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

Humulin® 70/30*

Genérico
Insulina NPH

Cuándo aplicarla
Aplíquela 30 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción
Entre 30 y 60 minutos

Pico de acción
De 1 a 5 horas

Duración de acción
De 18 a 24 horas

Caducidad después de abrirla
31 días

Novolin® 70/30

Genérico
Insulina NPH

Cuándo aplicarla
Aplíquela 30 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción
Entre 30 y 60 minutos

Pico de acción
De 1 a 5 horas

Duración de acción
Hasta 24 horas

Caducidad después de abrirla
42 días

Humalog® 75/25*

Genérico
Insulina aspart

Cuándo aplicarla
15 minutos antes de la comida.

Tiempo de inicio de acción
De 10 a 15 minutos

Pico de acción
Varía

Duración de acción
De 16 a 22 horas

Caducidad después de abrirla
28 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).

Inyecciones agonistas del GLP-1

Victoza®

Genérico
Liraglutida

Cómo funciona
- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla
- Una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.
- Una vez a la semana, el mismo día cada semana.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.

Posibles efectos
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Disminución del apetito
- Indigestión
- Reflujo ácido
- Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes)

Caducidad después de abrirla
30 días

Ozempic®*

Genérico
Semaglutida

Cómo funciona
- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla
- Una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.
- Una vez a la semana, el mismo día cada semana.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.

Posibles efectos
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Disminución del apetito
- Indigestión
- Reflujo ácido
- Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes)

Caducidad después de abrirla
56 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).

Trulicity®*

Genérico
Dulaglutida

Cómo funciona
- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla
- Una vez al día, por la mañana o antes de irse a dormir.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.
- Una vez a la semana, el mismo día cada semana.
- Puede aplicarse con o sin alimentos.

Posibles efectos
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Disminución del apetito
- Indigestión
- Reflujo ácido
- Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes)

Caducidad después de abrirla
14 días

Byetta®*

Genérico
Exenatida

Cómo funciona
- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Limita la cantidad de azúcar que el hígado libera hacia la sangre.

Cuándo aplicarla
Dos veces al día.

Posibles efectos
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Disminución del apetito
- Indigestión
- Reflujo ácido
- Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes)

Caducidad después de abrirla
30 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).

Soliqua®*

Genérico
Insulina glargina/lixisenatida

Cómo funciona
- Ayuda a su cuerpo a liberar insulina cuando su nivel de azúcar está alto.
- Retarda la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que hace que se sienta lleno por más tiempo.
- Contiene insulina de acción prolongada.

Cuándo aplicarla
Una vez al día, por la mañana, antes de consumir su primera comida del día.

Posibles efectos
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Dolor de estómago
- Disminución del apetito
- Indigestión
- Reflujo ácido
- Nivel bajo de azúcar en la sangre (cuando se usa con otros medicamentos para la diabetes)

Caducidad después de abrirla
28 días

* Medicamentos que actualmente no están cubiertos, no forman parte del formulario o requieren Programa de Asistencia con las Recetas (PAP, Prescription Assistance Program).